

Resultados de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en la Población de Educación Secundaria en Costa Rica. Año 2015
Percepción de gran riesgo de:
Por sexo y Total
(Porcentajes)

Riesgo	Hombres	Mujeres	Total
Fumar cigarrillos frecuentemente	58.82%	68.39%	63.63%
Embriagarse con bebidas alcohólicas	57.71%	66.98%	62.37%
Tomar medicamentos sin prescripción médica frecuentemente	38.59%	51.13%	44.90%
Inhalar pegamentos, pinturas, lacas, desodorantes, gasolina o cosas similares alguna vez	42.44%	47.83%	45.15%
Inhalar pegamentos, pinturas, lacas, desodorantes, gasolina o cosas similares frecuentemente	57.17%	65.42%	61.32%
Fumar marihuana alguna vez	27.24%	28.80%	28.03%
Fumar marihuana frecuentemente	52.50%	62.11%	57.33%
Fumar pasta base, básica, bazuco o crack alguna vez	46.84%	45.28%	46.06%
Fumar pasta base, básica, bazuco o crack frecuentemente	62.11%	68.96%	65.56%
Esnifar cocaína alguna vez	42.82%	42.43%	42.63%
Esnifar cocaína frecuentemente	62.16%	69.74%	65.97%
Inhalar Popper alguna vez	<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>
Inhalar Popper frecuentemente	<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>
Usar éxtasis alguna vez	41.54%	43.72%	42.63%
Usar éxtasis frecuentemente	56.00%	64.18%	60.12%

Fuente: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). *nd* = no hay dato