

Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General en Costa Rica. Año 2015

Porcentaje de residentes de 12 a 70 años en hogares con percepción de gran riesgo sobre pautas de consumo de varias drogas, por sexo.

Riesgo	Hombres	Mujeres	Total
Fumar frecuentemente cigarrillos de tabaco	85.07%	86.92%	85.99%
Embriagarse con bebidas lcohólicas	83.74%	83.48%	83.61%
Tomar medicamentos sin prescripción médica frecuentemente	84.46%	86.21%	85.33%
Inhalar disolventes de vez en cuando	82.90%	82.59%	82.75%
Inhalar frecuentemente disolventes	88.98%	89.81%	89.39%
Fumar marihuana de vez en cuando	58.82%	64.58%	61.67%
Fumar marihuana frecuentemente	79.56%	84.93%	82.22%
Consumir crack de vez en cuando	86.18%	85.64%	85.91%
Consumir crack frecuentemente	92.25%	92.35%	92.30%
Consumir cocaína de vez en cuando	81.84%	82.83%	82.33%
Consumir cocaína frecuentemente	91.96%	91.77%	91.85%
Inhalar Popper alguna vez	nd	nd	nd
Inhalar Popper frecuentemente	nd	nd	nd
Consumir éxtasis o anfetaminas de vez en cuando	84.18%	84.04%	84.11%
Consumir éxtasis o anfetaminas frecuentemente	90.26%	90.76%	90.51%

Fuente: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). *nd = no hay dato*